

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2025 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-13

Tyrimų, kurie nemokamai atliekami įstaigoje prisirašiusiems apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu pacientams, jei yra reikalingi šeimos gydytojo kompetencijai priskiriamoms ligoms, būklėms ir sveikatos sutrikimams diagnozuoti, bei vertinti jų rezultatus, sąrašas:

1. Bendras šlapimo tyrimas;
2. albumino/kreatininino santykis šlapime;
3. bendras kraujo tyrimas;
4. biocheminiai kraujo tyrimai:
 - lipidų apykaitos tyrimas (lipidograma arba lipidų frakcijos atskirai);
 - kalis, natris;
 - kreatininas;
 - alanininė aminotransferazė (GPT), asparagininė aminotransferazė (GOT), šarminė fosfatazė, **kreatinkinazės**, gama glutamiltransferazė (GGT);
 - **bendro balymo tyrimas**;
 - bilirubinas (bendras ir tiesioginis);
 - šlapimo rūgštis;
 - gliukozė.
5. Skydliaukės funkcijos tyrimas (tirotropinis hormonas (TTH));
6. uždegimo rodiklis (C reaktyvinis balytas, eritrocitų nusėdimo greitis (ENG));
7. glikolizintas hemoglobinas (skiriama, kai pacientas yra gydomas nuo cukrinio diabeto);
8. gliukozės tolerancijos mėginys.
9. Kraujo krešumo sistemos būklės tyrimai:
 - protrombino laikas (SPA ar kitu būdu), tarptautinis normalizuotas santykis (TNS):
 - a) kai pacientas gydomas geriamaisiais netiesioginio veikimo antikoagulantais;
 - b) numatyta planinė invazinė ir (ar) intervencinė procedūra;
 - aktyvintas dalinio tromboplastino laikas (ADTL):
 - a) kai numatyta planinė invazinė ir (ar) intervencinė procedūra.
10. Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas:
 - a) nėščiosioms;
 - b) kai numatyta planinė invazinė ir (ar) intervencinė procedūra (skiria ir vertina šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas).
11. Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh neigama, o vyro Rh teigiama kraujo grupė.
12. Prostatas specifinis antigenas:
 - a) pagal prostatas (priešinės liaukos) vėžio ankstyvosios diagnostikos prevencinę programą);
 - b) po radikalaus priešinės liaukos vėžio gydymo.
13. Sifilio (RPR) tyrimas:
 - a) nėščiosioms;
 - b) asmenims, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu.
14. *T. pallidum* hemagliutinacijos testo atlikimas (jei RPR testo rezultatas buvo teigiamas), asmenims, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu.
15. Tyrimas dėl virusinio hepatito B (HBsAg) (nėščiosioms).
16. Tyrimas dėl virusinio hepatito C:
 - a) asmenims, gimusiems 1945–1994 m. ir nepriskiriamiems rizikos grupei;
 - b) anti-HCV testo atlikimas asmenims, priskiriamiems rizikos grupei; (neatsižvelgiant į amžių ir lyti):
 - asmenims, kurių šeimos nariui diagnozuotas hepatitas C;
 - asmenims, kurie aktyviai vartoja švirkščiamuosius narkotikus;

- užsikrėtę ŽIV infekcija;
 - asmenims, gydomiems priklausomybės ligų klinikose.
17. Šlapimo pasėlio tyrimas, kai neatliekama antibiotikograma:
- a) nėščiosioms;
 - b) kuriems įtariama ar diagnozuota šlapimo takų infekcija ir turi būti priimamas sprendimas dėl antibakterinio gydymo taikymo (kodai N10, N11, N30, N34 ir N39 pagal TLK-10-AM).
17. Šlapimo pasėlio tyrimas, kai atliekama antibiotikograma:
- a) nėščiosioms;
 - b) kuriems įtariama ar diagnozuota šlapimo takų infekcija ir turi būti priimamas sprendimas dėl antibakterinio gydymo taikymo (kodai N10, N11, N30, N34 ir N39 pagal TLK-10-AM).
18. Žmogaus imunodeficitu viruso testas (ŽIV):
- a) nėščiosioms;
 - b) asmenims, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu.
19. A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymas atliekant greitąjį testą pacientams, susirgsusiems viršutinėmis kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis (tonzilitu, faringitu). Tyrimas atliekamas, kai turi būti priimamas sprendimas dėl antibakterinio gydymo skyrimo tikslungumo.
19. Slapto kraujavimo išmatose testas (skiriama pagal storosios žarnos vėžio ankstyvos diagnostikos prevencinę programą).
20. Tuberkulino mēginio (Mantu mēginio) atlikimas 6–7 metų vaikams ir rizikos grupių vaikams.
21. Gimdos kaklelio citologinis tepinėlis – kartą per 3 metus, 25-34 m. (imtinai) moterims, pagal gimdos kaklelio vėžio prevencinę programą.
22. Gimdos kaklelio aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso tyrimas (AR ŽPV) ir gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimas skystoje terpéje (jei AR ŽVP tyrimas teigiamas) – kartą per 5 metus, 35-59 m. (imtinai) moterims, pagal gimdos kaklelio vėžio prevencinę programą.
23. Ginekologinis tepinėlis iš maksties ir gimdos kaklelio.
24. Enterobiozės tyrimas.
- 25. Feritino tyrimas.**
26. Geležies tyrimas.
27. Natriuretinio peptido tyrimas.
28. Greitojo SARS-CoV-2 antigeno ir gripo testo atlikimas ar greitojo SARS-CoV-2 antigeno, gripo ir respiracinių sincitinio viruso (RSV) testo atlikimas (Skiria ir tyrimo rezultatus įvertina šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, slaugytojas arba išplėstinės praktikos slaugytojas, kai reikia atlikti COVID-19 (koronaviruso infekcijos) ligos ir gripo, diferencinę diagnostiką ar COVID-19 (koronaviruso infekcijos) ligos, gripo ir respiracinių sincitinio viruso (RSV) diferencinę.